



# FEBBRE DEL NILO OCCIDENTALE: CONOSCERLA E PREVENIRLA

La Malattia del Nilo Occidentale, o West Nile Disease (WND), è causata da un virus che alberga negli uccelli selvatici e che può essere trasmesso attraverso la puntura di zanzara a mammiferi, uccelli, rettili. In rari casi l'uomo può contrarre il virus, ma non può contagiare altre persone.

## IL CICLO DI TRASMISSIONE DEL VIRUS



Il virus  
può essere  
trasmesso all'uomo  
solo dalla  
zanzara!

## I SINTOMI NELL'UOMO

- 80% nessun sintomo
- 20% malattia simil-influenzale (febbre, mal di testa, nausea, vomito, linfonodi ingrossati, sfoghi cutanei)
- 1% sintomi neurologici. Nello 0,6% dei casi, il virus provoca gravi forme neurologiche (encefalite, meningoencefalite o paralisi flaccida)

## LA PREVENZIONE

Non esiste un vaccino per l'uomo. Occorre perciò evitare le punture di zanzara. Come?



- ▶ all'aperto utilizzare repellenti per gli insetti
- ▶ schermare porte e finestre con zanzariere
- ▶ svuotare di frequente sottovasi di fiori, secchi, copertoni, barili e altri contenitori in cui è presente acqua stagnante
- ▶ cambiare spesso l'acqua delle ciotole per animali
- ▶ tenere le piscine per i bambini vuote o coperte se inutilizzate
- ▶ trattare con prodotti larvicidi ogni 15 giorni tombini e pozzetti
- ▶ verificare che le grondaie siano pulite e non ostruite
- ▶ coprire le cisterne e i contenitori dove si raccoglie l'acqua piovana con coperchi ermetici, teli o zanzariere
- ▶ eliminare covatoi dove possono annidarsi volatili infetti

## LA TERAPIA

Non esiste una terapia specifica : i trattamenti sono mirati alla cura dei sintomi della malattia. Solo nei casi più gravi è necessario il ricovero in ospedale.